La Sclerosi Laterale Amiotrofica

Nuovi geni e nuovi meccanismi per capire e curare la malattia

Caterina Bendotti

Dipartimento Neuroscienze

Uni-ATENeO[®] "Ivana Torretta" - Anno Accademico 2014-2015

Nerviano, 30 ott 1956

SLA

Sclerosi Laterale Amiotrofica (Malattia del motoneurone- Malattia di Lou Gehrig)

- Degenerazione selettiva dei motoneuroni primari (corticali) e secondari (bulbari e spinali)

Midollo spinale

MOTONEURONE

>1 metro

Schwann Cell

Muscolo

Interneuroni

SINTOMI DELLA MALATTIA

- Debolezza agli arti
- Crampi muscolari
- Fascicolazioni muscolari
- Ipotonia muscolare
- Atrofia muscolare

CONSEGUENZE DELLA MALATTIA

- perdita della normale capacità di deglutizione (disfagia)
- perdita dell'articolazione della parola (disartria)
- perdita del controllo dei muscoli scheletrici (paralisi)
- perdita della capacità respiratoria
- morte (ipossia, infezioni respiratorie)
- *non altera le funzioni cognitive, sensoriali, sfinteriali e sessuali*

Stefano Borgonovo

EPIDEMIOLOGIA

INCIDENZA: 2-3 nuovi casi/100.000 ab./anno

PREVALENZA: 6-8 casi/100.000 ab. (circa 4000 casi in Italia)

Frequenza leggermente superiore nei maschi (rapporto M/F 1.4-2.5)

DISTRIBUZIONE: ubiquitaria e uniforme

ORIGINE: 10% familiare, 90% sporadica (pressochè indistinguibili)

ETA' MEDIA DI INSORGENZA: 60-70 anni

DURATA MEDIA: 2-5 anni (20% vive >5 anni e il 10% vive >10 anni)

TEMPO DI DIAGNOSI DAI PRIMI SINTOMI: 17 mesi

FATTORI DI RISCHIO PER LA SLA

DIFETTI GENETICI

- 13 geni associati alla forma familiare (SOD1, Alsin, TDP43.....)
- 7-10 geni/loci associati alla forma sporadica (VEGF,NF.....)

AMBIENTALI

- Esposizione a metalli (Pb,Al)
- Esposizione a tossine ambientali
 - (cyanobacteria neurotoxin, erbicidi, pesticidi)
- Infezioni virali (HIV; HTLV-1)

STILE DI VITA

- Calcio professionistico (rischio 8 volte maggiore)
- Intensa attività fisica
- Traumi ripetuti (testa, muscoli degli arti)
- Fumo

TERAPIA

Riluzolo (Rilutek) prolunga la sopravvivenza di 3-6 mesi

GENETICA DELLA SLA

% delle mutazioni genetiche individuate dal 1992

Familiare

Sporadica

(Modificato da Renton, et al. 2014)

Tipo di SLA	Cromosoma	Gene	Proteina	Funzione fisiologica
ALS1	21q22.1	SOD1	Cu/Zn superoxide dismutase	protegge dallo stress ossidativo
ALS2	2q33-35	ALS2	Alsin	regola il trasporto di vescicole
ALS4	9q34	SETX	senataxin	regola la funzione del DNA e RNA
ALS5	15q15-21	SPG11	spatacsin	regola il trasporto negli assoni
ALS6-FTD	16p11.2	FUS	Fused in Sarcoma	regola la funzione del DNA e RNA
ALS8	20p13.33	VAPB	VAMP-associated protein	regola il trasporto di vescicole
ALS9	14q11	ANG	Angiogenin	regola il tRNA
ALS10-FTD	1q36	TARDBP	TAR-DNA binding protein	regola la funzione del DNA e RNA
ALS11	6q21	FIG4	PI(3,5)P(2)5 phosphatase	regola il trasporto delle proteine
ALS12	10p15-p14	OPTN	Optineurin	regola la degradazione delle proteine
ALS13	Xp11.23	UBQLN2	Ubiquitin like protein ubiquilin 2	regola la degradazione delle proteine
ALS14-FTD	9p21	C9ORF72	unknown	regola la degradazione delle proteine ?
ALS	5q31.2	MATR3	Matrin 3	regola la funzione del DNA e RNA

Il gene C9orf72 mutato nella SLA

n= 2-23 nei controlli , n=100-1000 nei pazienti SLA

SL-TDP43 (sALS)

TDP43 Glial (sALS)

HI+SL-TDP43 (sALS)

LBI-SOD1 (fALS)

SL-OPTN (sALS)

LBI-VCP (sALS)

UBQL2(fALS)

SL-FUS (fALS)

HI-OPTN (sALS)

Modelli sperimentali per lo studio della SLA

Cellulari

Linee cellulari MN(NSC34)

Primary motor neurons
and co-cultures

Animali

Drosophila

Zebrafish embryo

C.Elegans

Topi geneticamente
modificati

Staminali umane pluripotenti indotte (iPSC)

I motoneuroni ottenuti da iPSC di pazienti SLA con mutazione C9ORF72 sono più deboli

La SLA è una malattia multicellulare

Topo transgenico per la SOD1G93A: modello di SLA familiare

Topo SODG93A

Paziente SLA

PROGRESSIONE DELLA MALATTIA NEI TOPI SOD

Caratteristiche neuropatologiche

Perdita motoneuronale (%)	8	44	54
Gliosi reattiva	+	++	+++
Inclusioni proteiche	+	++	+++
Alterazioni mitocondriali	+ ++	+++	++

EZIOLOGIA: la complessità della SLA

Malattia *MULTIFATTORIALE*

- ❖ Eccitotossicità
- ❖ Aggregazione proteica
- ❖ Alterata degradazione proteica
- ❖ Disfunzione mitocondriale
- ❖ Omeostasi del Ca^{2+}
- ❖ Alterazioni trasporto assonale
- ❖ Gliosi reattiva

DANNO MOTONEURONALE

Test preclinici nei topi transgenici SOD1 in 20 anni

Totale studi : **234**

Effetto positivo sulla sopravvivenza: **154** (66%)

Meccanismo d'azione :

- Antiossidante : **52**
- Anti-eccitotossicità: **20**
- Anti-aggregazione: **25**
- Anti-infiammazione /immunomodulatori : **33**
- Anti-apoptotici: **14**
- Neurotrofici: **35**
- Combinazione: **20**
- Cellule staminali: **25**
- Altri: **10**

Variabilità di sopravvivenza nei pazienti SLA

Variabilità nella progressione della malattia in due topi transegnici per SOD1

La differenza nella progressione della malattia non dipende dalla perdita dei motoneuroni ma dalla denervazione dei muscoli

Cheroni et al Human Mol. Gen. 2009
 Bendotti et al. Progress Neurobiol, 2012
 Marino et al. Neurobiol Aging 2014

METHODS 1

Laser Capture Microdissection

LUMBAR VENTRAL SPINAL CORD
(1000 MN each mouse)

RNA EXTRACTION AND PURIFICATION cDNA AMPLIFICATION

Microarray Analysis

SYSTEM BIOLOGY ANALYSIS

Malattia a progressione lenta

Malattia a progressione rapida

Conclusioni

- ✓ La SLA è una malattia complessa che dipende nelle forme familiari dalla mutazione di vari geni con funzioni diverse
- ✓ Sono implicati diversi meccanismi che coinvolgono non solo il motoneurone ma anche le cellule che gli stanno intorno nel sistema nervoso e nel sangue.
- ✓ Data tale complessità occorre agire con terapie farmacologiche ad azione multipla e non mediante interventi su singoli meccanismi